

Comunicato stampa

L'importanza del controllo regolare di tutte le viti nella lotta obbligatoria contro il vettore della flavescenza dorata

Bellinzona, 27 luglio 2016

La Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia comunica a tutti i viticoltori del Cantone che i controlli effettuati dal Servizio fitosanitario hanno confermato che i due trattamenti obbligatori eseguiti con il prodotto Applaud contro la cicalina vettore della flavescenza dorata, lo *Scaphoideus titanus*, hanno dato dei buoni risultati. Per questo motivo non è necessario effettuare, in maniera generalizzata, il terzo trattamento con un prodotto abbattente (Reldan, Pyrinex).

Continuano comunque regolarmente i controlli tramite trappole poste in alcuni vigneti del Cantone. In casi particolari, i viticoltori interessati saranno contattati direttamente dal Servizio fitosanitario.

La flavescenza dorata è ancora presente nel nostro Cantone e quest'anno i sintomi della malattia sono già stati riscontrati in alcuni vigneti, in modo particolare sulla varietà Chardonnay.

È quindi molto importante controllare tutte le viti del Cantone, anche quelle di uva americana nei giardini, e segnalare al Servizio fitosanitario eventuali casi sospetti.

I sintomi della flavescenza dorata sono simili a quelli del legno nero, un'altra malattia da fitoplasmi, già presente in tutto il Cantone, meno epidemica della flavescenza dorata.

Le viti con sintomi manifesti della flavescenza dorata e del legno nero devono essere estirpate.

Presso il Servizio fitosanitario è a disposizione una scheda tecnica sulla flavescenza dorata, che può essere consultata anche sul sito internet www.ti.ch/fitosanitario, dove si possono trovare delle fotografie con i sintomi della malattia.

Questi ultimi sono:

Foglie

La lamina fogliare si ispessisce, assumendo una consistenza cartacea, e nelle varietà più sensibili si accartocchia verso il basso con la tipica forma a triangolo. Le foglie presentano una colorazione gialla più o meno intensa su vitigni a uva bianca, oppure violacea-vinosa su varietà a bacca rossa. Le colorazioni possono essere limitate a un solo settore della foglia oppure interessare tutta la lamina fogliare comprese le nervature.

Tralci

Rimangono erbacei con parziale e irregolare lignificazione. Di consistenza gommosa, tendono a piegarsi verso il basso, conferendo alla pianta un aspetto prostrato. Disseccando,

Bellinzona, 27 luglio 2016

i tralci assumono una colorazione nerastra.

Grappoli

Appassiscono fino a seccare completamente oppure in caso di infezioni di più anni non appaiono nemmeno.

Sulla varietà Merlot i sintomi sono un po' meno marcati e possono apparire anche su un solo tralcio di vite. Oltre agli arrossamenti è sempre presente il disseccamento completo dei grappoli.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Luigi Colombi, Sezione dell'agricoltura, Servizio fitosanitario, luigi.colombi@ti.ch, 091 /814 35 86